

Załącznik nr 3 Instrukcje dla zespołów

- **Kaniulacji żyły obwodowej** należy dokonać poprzez założenie niezaciśniętej stazy, a następnie przyłożenie do ciała pozoranta, w odpowiednim miejscu, zabezpieczonego nasadką venflonu wybranej grubości, umocowanie go okleina, usunięcie mandrynu oraz umieszczeniem mandrynu w pojemniku na odpady skażone. Dojście doszpikowe wykonuje się w sposób rzeczywisty gotowym zestawem (np. EZ-IO, BIG, NIO) o ile sędzia nie zaleci inaczej.
- **Przetoczenia płynów** należy dokonać montując zestaw kroplowy, odpowietrzając go i podłączając z zamkniętym przepływem do venflonu (zestaw do infuzji nie może zostać zmontowany przed przystąpieniem do zadania). Butelka z płynem infuzyjnym musi być pełna przed rozpoczęciem zadania.
- **Podania leku** dożylnie, podskórnym, domięśniowo, doszpikowo należy dokonać nabierając wybrany lek (lub symbolizującą go 0,9% NaCl albo wodę do iniekcji) do strzykawki, informując sędziego o drodze i dawce, a następnie, jeżeli sędzia nie poinformuje inaczej, usuwając zawartość strzykawki na ziemię lub do wskazanego naczynia. Podania leku doustnie należy dokonać pokazując sędziemu lek i informując o podaniu go oraz wybranej dawce.
- **Intubację** należy wykonać realnie na symulatorze/fantomie/preparacie.
- **Podłączenia monitora** należy dokonać poprzez położenie kabli z elektrodami na ciele pozoranta (bez naklejania elektrod) lub podłączając elektrody w sposób realny do przeznaczonych do tego celu elementów na symulatorze/fantomie/preparacie. Wykonując 12-odprowadzeniowy zapis EKG należy poinformować sędziego o miejscu przyklejenia elektrod.
- **Defibrylację** należy wykonać w sposób realny na symulatorze/fantomie/preparacie. Za bezpieczeństwo podczas wykonywania defibrylacji odpowiada zespół. Powyższe zasady dotyczą również wykonywania kardiowersji oraz elektrostymulacji. Udostępnione przez organizatora defibrylatory manualne są defibrylatorami klinicznymi.
- **Tlenoterapia:** zestaw do tlenoterapii musi być zmontowany, maska tlenowa umieszczona przy twarzy poszkodowanego. Należy podać sędziemu ilość litrów na minutę. Rzeczywiste użycie tlenu nie jest dozwolone.
- **Odsysanie** wydzieliny z dróg oddechowych przeprowadza się w sposób rzeczywisty na symulatorze/fantomie/preparacie. W przypadku pozoranta po

skompletowaniu sprzętu zespół informuje sędziego o wykonaniu procedury odsysania.

- **Dojście doszpikowe** przeprowadza się w sposób rzeczywisty na symulatorze/fantomie/preparacie
- **Tamowane krwotoków** przeprowadza się w sposób rzeczywisty na symulatorze /fantomie/preparacie.

Sędziowie podają parametry życiowe poszkodowanego tylko po ich prawidłowym sprawdzeniu przez zawodnika. Wszelkie pozostałe procedury i zabiegi podczas zadania należy wykonać w sposób rzeczywisty, o ile sędzia nie zaleci inaczej.